

La **otitis infecciosa** externa es la inflamación de la piel del conducto auditivo externo. La dolencia varía con el clima (en primavera- verano el porcentaje aumenta de forma considerable).

Causas

- **Parásitos:** Otodectes cynotis es un ácaro psoróptico que vive de manera habitual en perros y gatos. Es habitual en el campo y en los criaderos.
- **Cuerpo extraños y traumatismos:** espigas, trozos de madera, semillas, restos de pomadas, jabones, tras una pelea. Procesos dérmicos que se extienden hasta el conducto auditivo.
- **Alergias:** Trastornos de la queratinización.

Síntomas

Podemos sospechar de una otitis si:

- El animal se rasca la oreja u orejas más de lo habitual
- No para de frotarse contra las alfombras
- Se sacude constantemente en un inútil esfuerzo de sacar de su oído un cuerpo extraño
- Cuando se le acaricia en las orejas y se queja.
- Secreción anormal en aspecto y en olor.
- Cuando al sacudirse elimina abundante secreción.
- Los oídos le huelen mal.

Éstas son algunas de las señales que nos envían los animales para llamar la atención de que algo no va bien y que se deben poner sus oídos en manos de un veterinario.

Diagnóstico

La predisposición racial, la época, el lugar de residencia, si ha sido bañado hace poco o si se ha peleado con otro animal..., son datos importantes para el diagnóstico. Los signos clínicos encontrados, tanto locales como generales orientan hacia el tipo de proceso. El diagnóstico concluye con una exploración del oído mediante otoscopio por parte del veterinario, así como la realización de frotis de la secreción, y se envía al bioquímico para buscar/confirmar la causa.

Tratamiento

1 Cuerpos extraños : Se debe primero eliminar el cuerpo extraño y después tratar la otitis que éste ha provocado. Siempre se procederá a hacer una limpieza del canal para que las soluciones tópicas a emplear para el tratamiento puedan contactar adecuadamente con el epitelio del conducto. Para ello hay soluciones higienizantes para el oído ya comercializadas.

2 Presencia de huevos de Otodectes cynotis : una vez efectuada la limpieza se tratará el oído dependiendo de qué agente esté actuando: acaricidas, antifúngicos o antibióticos. Muchas de las soluciones óticas combinan dos o tres de estos principios activos y además suman el efecto de antiinflamatorios, generalmente corticoides e incluso anestésicos locales. En algunos casos, además de la vía tópica se utilizará la parenteral y/u oral para favorecer la resolución del proceso.

3 Otitis por Malassezia pachydermatis : Si la otitis es un proceso más dentro de una enfermedad general, además de la otitis se tendrá que tratar la causa de la enfermedad general, si no, cualquier esfuerzo será inútil. Como complemento se puede colocar un collar isabelino para evitar lesiones producidas por el rascado. Es muy importante, como en cualquier proceso, cumplir con el tratamiento para evitar complicaciones y posibles recidivas.

Prevención

Se puede intentar prevenir la otitis realizando una limpieza periódica de los oídos.

Se levanta la oreja para intentar suavizar la acodadura del conducto, después se instilan unas gotas de solución higienizante y se realiza un masaje en la base de la oreja. Se suelta el pabellón y se deja al animal que se sacuda, cuando ha terminado de sacudirse se limpian únicamente los pliegues del pabellón auricular. La limpieza más en profundidad debe dejarse para que la realice el veterinario.